

# RNSC HATO VENECIA DE GUANAPALO



**Guía de aves, mamíferos,  
reptiles y anfibios.**

**“Área de Desarrollo  
Llanos 23 Norte”**


# RNSC Hato Venecia de Guanapalo



Especies registradas en los estudios de fauna realizados por CEDCO a través de HÁBITAT en el área del proyecto LLANOS 23 NORTE.

Vigencia 2022 a 2024.

## ESPECIES





# Aves migratorias: Playero diminuto

Las aves migratoria boreales, visitan las regiones de Colomba cada año llegando en septiembre y yéndose en abril donde inician su vuelo hacia Canadá y Estados Unidos.

*Calidris minutilla*  
Abr./2024





# Aves migratorias: Chorlito y Playero manchado

Las aves migratoria boreales, visitan las regiones de Colomba cada año llegando en septiembre y yéndose en abril donde inician su vuelo hacia Canadá y Estados Unidos.

*Tringa solitaria*  
Abr./2024



*Actitis macularius*  
Sep./2023





# Aves migratorias: Reinita acuática y Golondrina ribereña

Las aves migratoria boreales, visitan las regiones de Colomba cada año llegando en septiembre y yéndose en abril donde inician su vuelo hacia Canadá y Estados Unidos.

*Parkesia noveboracensis*  
Dic./2022



*Riparia riparia*  
Abr./2024





# RNSC Hato Venecia de Guanapalo



## Aves Residentes



*Dendrocygna autumnalis.*



# Colibríe de pecho blanco




*Chionomesa  
fimbriata*





*Chrysuronia versicolor*





# Colibríe esmeralda

*Chlorostilbon  
mellisugus*







"ave fósil viviente", muestra características que lo vinculan con el ***Archaeopteryx***, un fósil de transición entre los dinosaurios y las aves modernas.



*Opisthocomus hoazin*



# Pato aguja



hembra

Ave nadadora, tiene la capacidad de sumergirse para conseguir alimento, además de peces consume serpientes y cangrejos.



*Anhinga  
anhinga*

macho



# Tinamú chico

*Crypturellus soui*

Ave difícil de avistar, es más fácil detectarla por su canto. Mediante fototrampeo se pueden obtener registros de aves escurridizas como este tinamú. Un dato a tener en cuenta es que construye su nido en el suelo.



# Pajuil o Paujil

*Mitu  
tomentosum*




Ave de gran tamaño, en promedio mide 84 cm de longitud.  
En 2023 la IUCN declaró esta especie en PREOCUPACIÓN MENOR (LC), previamente  
estaba categoría de CASI AMENAZADA (NT).



# Guacharaca

*Ortalis  
ruficauda*







*Colinus cristatus*







*Pteroglossus  
castanotis*

Además de alimentarse de frutos e insectos, se caracteriza por consumir huevos que puede robar de los nidos de otras especies.





*Galbula ruficauda*









*Tachycineta albiventer*



*Progne tapera*





# Cascabelitos y Carsucio

*Forpus conspicillatus*



*Eupsittula pertinax*





# Loros y guacamayas





*Ara ararauna*



# Carpinterito escamado

*Picumnus  
squamulatus*

Es el más pequeño de los carpinteros de esta zona,  
miden entre 13 y 16 cm de longitud.  
Su dieta es insectívora, principalmente hormigas,  
escarabajos y saltamontes.






# Carpintero habado



*Melanerpes rubricapillus*



Anida en agujeros de árboles muertos y  
ambos padres incuban los huevos.  
Su dieta no solo son insectos, también  
se alimenta de frutas



# Carpintero punteado



*Colaptes  
punctigula*

Es poco común observarlo. Aunque su población es estable, enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat, la fragmentación de bosques





# Carpintero real



hembra



*Dryocopus  
lineatus*



macho



# Martines pescadores



*Chloroceryle amazona*  
Hembra



*Chloroceryle americana*  
Hembra



# Martines pescadores



hembra

*Chloroceryle amazona*



macho



# Chiricoca o cotera y Tirana



*Aramides  
cajaneus*



*Eurypyga  
helias*



*Rynchops  
niger*

Tiene un pico adaptado que le permite “rayar” la superficie del agua mientras vuela para atrapar peces. vuela bajo sobre el agua con el pico abierto, dejando que la mandíbula inferior roce la superficie. Cuando detecta una presa, cierra el pico rápidamente





# Cigüeñuela y Gaviota

*Himantopus mexicanus*



*Phaetusa simplex*





# Gallito de agua





# Alcaraván playero o chorlito







*Vanellus  
chilensis*



*Hesperoburhinus bistriatus*





# Pato carretero

*Oressochen jubatus*

Especie listada en Colombia VULNERABLE  
(VU), por la Resolución 0126 de 2024.







Hembra

Macho

*Amazonetta  
brasiliensis*





# Pato wirirí y Pato careto

*Dendrocygna autumnalis*



*Dendrocygna viduata*





# Aruco y Chicuaco de agua

*Anhima  
cornuta*

Esta ave posee una estructura córnea queratinosa en forma de espina que sobresale de su cabeza, parecida a un cuerno. Mide entre 84 y 95 cm. se alimenta casi exclusivamente de plantas acuáticas

*Butorides  
striata*






*Theristicus  
caudatus*



*Eudocimus  
ruber*



Su plumaje rojo brillante proviene de los carotenoides presentes en los crustáceos que consume, como cangrejos y camarones. Vuela en formación en V, lo que reduce la resistencia del aire y mejora la eficiencia del grupo.



*Phimosus infuscatus*





# Zamurita y Tarotaro

*Mesembrinibis cayennensis*



*Cercibis oxycerca*





# Gaván huesito

*Mycteria  
americana*

Caza con el pico abierto bajo el agua: cuando una presa toca el interior del pico, este se cierra en solo 25 milisegundos, uno de los reflejos más rápidos del reino animal. Anida en grandes colonias sobre árboles en humedales. Ambos padres incuban los huevos y alimentan a los polluelos.





# Gaván soldado

*Jabiru mycteria*



Es la cigüeña más grande de América con hasta 1,5 metros y una envergadura de hasta 3 metros. Su alimentación consiste en pescar y cazar presas vivas como peces, ranas, serpientes, moluscos, insectos e incluso crías de caimanes y tortugas. Construye nidos enormes en árboles altos, que pueden ser reutilizados año tras año. Vive entre 30 y 40 años, y las parejas suelen ser monógamas

18/09/2023

12



# Garzas chusmita

*Egretta thula*

También llamada como  
garza patiamarilla  
porque los dedos de sus  
patas son amarillos.



*Egretta  
caerulea*





# Garza real y Garza morena

*Ardea alba*



*Ardea cocoi*





# Garcita del ganado

*Ardea ibis*







*Syrigma sibilatrix*



*Platalea  
ajaja*

Se alimenta moviendo su pico de lado a lado en aguas poco profundas para filtrar pequeños animales del barro, como crustáceos, insectos, moluscos y peces pequeños





*Megarynchus pitangua*









# Tijereta y Sirirí



*Tyrannus  
savana*



*Tyrannus  
melancholicus*





# Atrapamocas

*Elaenia  
flavogaster*



*Sublegatus  
arenarum*





# Sirirí rayado y Caballicero

*Myiodynastes maculatus*



*Machetornis  
rixosa*





# Mosquerito ojiblanco y Espatulilla



*Atalotriccus  
pilaris*



*Todirostrum  
cinereum*







*Pipra filicauda*  
hembra



*Tolmomyias*  
*flaviventris*







*Pyrocephalus rubinus*







*Fluvicola pica*




# Castillero Ilanero o Cucarachero

*Phacellodomus  
rufifrons*






*Sakesphorus canadensis*  
hembra



*Thamnophilus*  
*doliatus*  
macho







*Formicivora*  
*grisea*  
macho



*Pachyramphus*  
*polychopterus*  
hembra



# Tordo Ilanero

*Quiscalus  
lugubris*







*Icterus  
nigrogularis*

*Icterus  
icterus*



Especie listada en  
Colombia VULNERABLE  
(VU), por la Resolución  
0126 de 2024.





*Psarocolius  
decumanus*



*Cacicus cela*



# Buche amarillo y Cocha



*Gymnomystax  
mexicanus*

*Molothrus  
oryzivorus*





# Petirrojo o Bayetón

*Leistes militaris*



juvenil



adulto



*Coereba flaveola*



*Sturnella magna*





*Saltator coerulescens*





# Cardenalito y Frutero

*Paroaria nigrogenis*



*Tachyphonus rufus*





# Pico de plata

*Ramphocelus carbo*



Macho




Hembra



# Azulejo y Azulejo palmero

*Thraupis  
episcopus*



*Thraupis  
palmarum*





Macho



*Sporophila  
intermedia*

Hembra





*Sicalis flaveola*



*Sicalis columbiana*



*Sicalis luteola*







*Euphonia  
lanirostris*  
hembra



*Euphonia  
chlorotica*  
macho





*Ammodramus aurifrons*





# Jirigüelo y Cuco ardilla menor

*Crotophaga ani*





*Coccyzua minuta*





# Cuco ardilla y Cuco crespín







*Columbina  
talpacoti*







*Leptotila  
rufaxilla*



*Leptotila  
verreauxi*





*Patagioenas cayennensis*



*Leptotila verreauxi*



# Tortolita y Paraulata

*Columbina  
squammata*



*Mimus  
gilvus*





# Mirra embarradora y Paraulata

*Turdus  
ignobilis*



*Turdus  
nudigenis*





*Falco  
femoralis*





*Falco sparverius*



Hembra



Macho





*Caracara plancus*



*Milvago chimachima*





# Gavilán sabanero

*Buteogallus  
meridionalis*





# Gavilán caminero



*Rupornis magnirostris*





# Gavilán cangrejero grande



*Buteogallus  
urubitinga*






# Gavilán cienaguero

*Busarellus  
nigricollis*





# Chulo y Gualas



*Coragyps  
atratus*



*Cathartes  
burrovianus*



*Cathartes  
aura*





# Guardacaminos o bujío

*Nyctidromus albicollis*





# Guarracuco o Murruco

*Athene cunicularia*





# RNSC Hato Venecia de Guanapalo



## Mamíferos





# Venado cola blanca



*Odocoileus cariacou*

Especie listada en Colombia EN PELIGRO  
CRÍTICO (CR), por la Resolución 0126 de  
2024.





*Hydrochoerus hydrochaeris*





# Oso melero y Oso palmero

*Tamandua tetradactyla*



*Myrmecophaga tridactyla*



Especie listada en Colombia VULNERABLE  
(VU), por la Resolución 0126 de 2024.



# Puercoespín y Pícupe



*Coendou  
prehensilis*




*Dasyprocta fuliginosa*




# Lapa, Araguato y Zorro



*Cuniculus paca*



*Alouatta  
seniculus*



*Cerdocyon  
thous*





*Puma concolor*



Marcas de felino, posible *Puma concolor*



# Tigrillo o Cunaguaro

*Leopardus pardalis*





*Pteronura brasiliensis*

Especie listada en Colombia EN PELIGRO  
(EN), por la Resolución 0126 de 2024.

°F 18/05/2024 13:44:36



# Mamíferos voladores (muerciélagos)



*Rhynchonycteris naso*



*Rhynchonycteris naso*



*Cynomops planirostris*



*Cynomops planirostris*



*Carollia brevicauda*



*Noctilio albiventris*



*Phyllostomus hastatus*



*Saccopteryx leptura*



# Mamíferos voladores (muerciélagos)



*Artibeus planirostri*



*Mesophylla macconnelli.*



*Vampyriscus sp.*



*Dermanura sp.*



*Molossus molossus*



*Molossus molossus*



*Myotis riparius*



# RNSC Hato Venecia de Guanapalo



## Reptiles





Es una especie de serpiente venenosa. Normalmente tiene entre 60 y 90 cm, aunque puede alcanzar 145 cm. Su **veneno** es un **neurotóxico** potente, con acción pre- y post-sináptica, bloquea la transmisión neuromuscular, causando parálisis progresiva. Puede llevar a fallo respiratorio si no se trata a tiempo. En Colombia, el principal productor de suero antielapídico es el Instituto Nacional de Salud (INS)

*Micrurus  
lemniscatus*





# Cuatro narices

Es una serpiente venenosa de gran importancia médica. El veneno de *Bothrops atrox* es hemotóxico y proteolítico, afecta la coagulación sanguínea, provoca hemorragias internas y externas, puede causar insuficiencia renal aguda y, en casos graves, la muerte si no se trata a tiempo. En Colombia, el tratamiento se realiza con un suero antiofídico polivalente, producido principalmente por el Instituto Nacional de Salud (INS).

*Bothrops  
atrox*





# Culebra caracolera



*Sibon nebulatus*





# Cazadora rayada



*Lygophis lineatus*



# Falsa mapanare – Güio negro



*Leptodeira cf.  
ashmeadii*



*Eunectes  
murinus*







*Podocnemis unifilis*

Especie listada en Colombia como EN PELIGRO (EN),  
por la Resolución 0126 de 2024.



*Chelonoidis carbonarius*

Especie listada en Colombia VULNERABLE  
(VU), por la Resolución 0126 de 2024.





# Babilla o cachirre

*Caiman crocodilus*





# Iguana y Mato

*Iguana iguana*



17/09/2023

*Tupinambis cryptus*





# Gecko común

*Cnemidophorus  
gramivagus*





# Gecko común

*Hemidactylus frenatus*

Es una especie introducida, es nativo del Sudeste Asiático y de algunas islas del Pacífico. Ha colonizado buena parte del mundo tropical, en Latinoamérica está desde México hasta Argentina





# RNSC Hato Venecia de Guanapalo



## Anfibios





# Sapos y Rana picuda



*Rhinella beebei*



*Rhinella beebei*



*Rhinella marina*



*Leptodactylus fuscus*  
(con franja vertebral)



*Leptodactylus fuscus*  
(sin franja vertebral)



# Rana de bigotes



*Leptodactylus fragilis*



# Rana criolla



Es una especie de gran tamaño dentro de su familia, LEPTODACTYLIDAE , con tamaños entre 8 y 12 cm. Los machos tienden a ser un poco más grandes que las hembras, lo cual es inusual en muchas especies de ranas.

*Leptodactylus  
latrans*



17/09/2023 21:09



# Rana vaquera (oe)





# Rana lechera



*Trachycephalus  
typhonius*





# Rana de lluvia

*Scinax  
ruber*





# Rana arborícola trompuda

*Scinax wandae*





# Ranita Ilanera de pantanos



*Dendropsophus mathiassoni*





# Rana pingüino (endémica)

*Elachistocleis  
sikuani*

Hace parte de la familia MICROHYLIDAE, fue descrita en el año 2022, y es **endémica** de Colombia, específicamente de Casanare. Miden en promedio 3,2 cm. Es una rana excavadora, tiene la capacidad de cavar y vivir bajo tierra durante largos periodos





# Rana lemur



*Pithecopus  
hypochondrialis*



Las hembras depositan los huevos sobre hojas que cuelgan sobre el agua; al eclosionar, los renacuajos caen al agua.  
Alcanzan un tamaño de entre 5 y 6 cm.  
Puede verse afectada por la pérdida de hábitat debido a la deforestación.

11/09/2023





Bienvenidos a la Reserva Natural de la  
Sociedad Civil “Hato Vencia de Guanapalo”.